



Journée COHF 2014

Cas clinique

Dr Mnasri, CH Meaux.

- Monsieur V.S âgé de 64 ans
- HTA/ gammopathie monoclonale IgG
- OD rouge et douloureux + BAV depuis une semaine d'installation brutale.
- Examen OG RAS
- Examen OD
 - AV = 1/10
 - TO = 40 mmHg
 - PRD **granulomateux**
 - Tyndall CA à 1+
 - Iris RAS
 - Cristallin transparent
 - FO:


L'examen du FO




L'examen du FO



L'angiographie à la fluoresceine



L'angiographie à la fluoresceine




En résumé

- Panuveite unilatérale « granulomateuse » hypertensive avec un foyer chorio-rétinien
 - TTT General
 - TTT local
 - Contrôle dans une semaine
 - AV= 6/10
 - SA calme
 - TO= 18
 - FO:



...En reprenant l'interrogatoire, le patient signale avoir ressenti une gêne à l'œil droit alors qu'il était entrain de marteler un bloc de pierre quelques jours avant le début des symptômes.






Fig. 21 Name: VLLACAMBERGE ID:230633, Etiqueta: 1349-06-20

But

Toute inflammation intraoculaire, surtout si elle est d'allure atypique doit inciter à rechercher une notion de traumatisme et à réaliser au moindre doute une imagerie oculaire à la recherche de CEIO.